

FLORÆ MELITENSIS THESAURUS,

SIVE

PLANTARUM ENUMERATIO,

QUÆ

IN MELITÆ GAULOSQUE INSULIS

AUT INDIGENÆ AUT VULGATISSIMÆ

OCCURRUNT:

Addita, præter characterem specificum, citatione figurarum,
Plantarum rariorum statione, nec non singularum
specierum efflorescentia, duratione &c.

CURANTE STEPHANO ZERAPHA

MEDICINÆ DOCTORE,

INARIMES

MAGNI EGROTORUM HOSPITII

OLIM MEDICÒ.

“Privatas querimus opes.”

FASCICULUS I.



MELITÆ, MDCCCXXVII.

Veneunt ab Auctore apud Dupont Pharmacopolam in Via Mercanti No. 19.

504312

FLORAE MELITENSIS
THESAUURUS

1758

PLANTARUM ENUMERATIO

1758

IN MELITE GAUROSQUE INSULIS

AUT INDIGNIS AUT VULGARISSIMIS

OCCURRENT.

Adhibet, praeter characteres specierum, citationes scripturarum
Plantarum rariorum aetate, nec non singularem
speciem efflorescentis, durioris etc.

Rerum Naturæ contemplatio, medicum Medicinæ reddit aptiorem.
Cels.

In his curans mitigabit dolorem, & unguentarius faciet pigmenta
suavitatis, & unctiones conficiet sanitatis, & non consumabuntur
opera ejus. *Eccl. cap. 38. v. 7.*

FASCICULUS I.



MELITE, MDCCCLXVIII.

SAUCTORES ICHNOGRAPHIA

quorum opera in hunc usque diem

BARBARA 1755

BARBARA (Casp.) 1751

BARBARA (Joa.) 1750

BARBARA 1747

BARBARA 1737

BARBARA 1730

BARBARA 1701

BARBARA 1714

BARBARA 1713

BARBARA 1712

BARBARA 1701

BARBARA 1701

BARBARA 1739

BARBARA 1738

BARBARA 1738

BARBARA 1738

BARBARA 1738

BARBARA 1738

BARBARA 1738

BARBARA 1738

BARBARA 1738

* Fil. Nicolai Barth, & Mariæ Magdalenæ Sceberras ; obiit Vindobonæ,
die 7 Aprilis 1818. Ætatis suæ An. LXXIII.

AUCTORES ICHNIOGRAPHI

quorum opera adjuvi fuimus.

-
- BATTARRA, Fungorum agri ariminensis historia. *Faventia* 1755.
 BAUHINUS, (Casp:) Prodromus theatri botanici . *Basileæ* 1671.
 BAUHINUS, (Joan:) Hist. plantarum universalis . *Ebroduni* 1650.
 BLACKWELL, Herbarium a Trew emendatum . . *Norimbergæ* 1772.
 BOCCONE, Museo di piante rare. *Venezia* 1697.
 BULLIARD, Herbar de la France. *Paris* 1780.
 CLUSIUS, Rariorum plantarum historia. *Auterpiæ* 1601.
 COLUMNA, Phytobasanos, sive plantarum aliquot
 historia . . , *Faventia* 1744.
 CURTIS, Practical observations on the british
 grasses *London* 1812.
 EDWARDS, Botanical register *London* 1819.
 LA MARK, Illustrations des genres! *Paris* 1791.
 MATTIOLI, Sei discorsi sopra Dioscoride. *Venezia* 1604.
 MICHELI, Nova plantarum genera *Florentia* 1729.
 MILLER, Icones plantarum, *Norimbergæ* 1768.
 PARISENSIS, Memoires de l' academie royale des
 sciences de Paris, usque ad an-
 num 1786.
 SABBATI, Hortus romanus *Romæ* 1772.
 SAVI, Materia medica vegetabile. *Firenze* 1805.
 SEBASTIANI, Romanarum plantarum fasciculus
 alter *Romæ* 1815.
 ZANNONI, Istoria botanica *Bologna* 1675.

* Fil. Nicolai Barb. & Maria Magdalena Scherrens, obit. Vindobonæ
 die 7 Aprilis 1815. Aetatis suæ LXIII.

FLORÆ MELITENSIS THESAURUS.

FASCICULUS I.

1. **A**CANTHUS *mollis* (*Brankorsina Hannewia*), foliis sinuatis, inermibus. *Icon apud Sabb. hort. 3. t. 13. Black. t. 89.* Flores albi. Majo. In humentibus duris. *Perennis.*

2. **A**CANTHUS *spinosus* (*Brankorsina Xewwekìa*), foliis pinnatis spinosis. *Sabb. hort. 3. t. 14. Mill. ic. 7.* Floret Majo, in vallibus. *Perennis.*

3. **A**DIANTUM *Capillus Veneris* (*Torsin el b'ir*), fronde alternatim decomposita, pinnulis petiolatis cuneiformibus lobatis. *Lam. ill. t. 870, f. 1. Bull. t. 247.* In umbrosis humidis. *Perennis.*

4. **A**DONIS *annua* Enc: (*3allet el serdük*), caule glabro, superne sulcato; foliis multifido-linearibus; petalis 5. 8. ovato-oblongis, unguè nitido basi notatis; seminibus glabris. *Lam. ill. t. 498, f. 1.* Floret Martio, inter segetes. *Annua.*

5. **A**EGILOPS *ovata*, spica aristata, calycibus omnibus triaristatis. *Lam. t. 839, f. 1.* Floret Junio. In collibus. *Biennis.*

6. **A**GARICUS *campestris* (*Foqqiez*), stipitatus; pileo convexo squamato, albido; lamellis rufis. *Bull. t. 134. Bat. fung. t. 7. A.* Habitat in campis & pratis.

7. **A**JUGA *Chamepitys* (*Xantkùra*), caule diffuso foliis trifidis, floribus solitariis axillaribus folio brevioribus. *Sabb. hort. 3. t. 97. Matt. p. 992.* Flores flavi, rubro punctati. Martio. Secus vias. *Ann.*

8. **A**LLIUM *sativum* (*Tewm tal zrìz*), caule planifolio, bulbifero; bulbo composito; staminibus tricuspatis. In agris colitur; *Perennis.*

9. *ALLIUM Cepa (Basal)*, scapo nudo, inferne ventricosus, longiore, foliis teretibus. *Sabb. hort. 6. t. 99.* Floret Majo, in arvis colitur. *Perennis.*

10. *ALLIUM Chamæ Moly (Tewm qerqni)*, umbella capsulifera pauciflora, staminibus simplicibus, capsulis nutantibus, scapo brevissimo, foliis linearibus pilosis. *Sabb. hort. 7. t. 5.* Floret Januario, in sterilibus. *Per.*

11. *ALLIUM album (Tewm abyad)*, scapo nudo obsolete triquetro; foliis radicalibus lineari-lanceolatis, carinatis umbella capsulifera; petalis ovatis staminibus simplicibus. Flores candidi. Martio. In agris. *Per.*

12. *ALLIUM Porrum (Korràt)*, caule planifolio, umbellifero, staminibus tricuspидatis, radice tunicata. *Sabb. hort. 6. t. 98. Black. t. 421.* Flores purpureo-virides. Junio. *Per.*

13. *ALLIUM Ampeloprasum (Korràt selvagg)*, umbella capsulifera globosa, staminibus exsertis alterne tricuspидatis, foliis planis carinatis, radice tuberibus duobus solidis castaneæformibus. Scorodoprasum l. *Clus. hist. p. 190.* Floret Junio; in agris. *Perennis.*

14. *ALLIUM subhirsutum (Tewm mosuèf)*, caule planifolio, umbellifero, foliis inferioribus hirsutis, staminibus subulatis. Moly Dioscoridis. *Clus. hist. p. 192.* Flores candidi; Aprili, in agris. *Perennis.*

15. *ALLIUM magicum (Coplays)*, umbella capsulifera hemisphærica, staminibus simplicibus, scapo tereti, foliis lanceolatis, altero apice bulbifero. *Clus. hist. p. 191.* Floret Aprili, in campis. *Per.*

16. *ALOES vulgaris (Sabbara)*, foliis patulis, adscendentibus, margine spinosis, pedunculo ramoso, ramis bractea duplici amplexis. *Black. t. 229.* Floret Majo, in sterilibus *Puales.* *Per.*

17. *ALOPECURUS pratensis*, culmo erecto lævi, spica sublobata, glumis calycinis acutis villosis basi connatis arista corollina brevioribus. *Lam. ill. t. 42. Curtis obser. t. 2.* Floret Aprili, secus aquæducta *Marsæ.* *Per.*

18. *ALOYSIA citriodora* (*Alwiza*), foliis lanceolato-linearibus ternis, caule fruticoso. Floret Junio, *Frut.* Folia citrum redolent.

19. *ALSINE media*, caule latere alterno piloso, petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Lam. ill. t. 214.* Flores albi. Martio. *Ann.*

20. *ALTHÆA rosea* (*Hatar ta S. Gusepp*), caule erecto, foliis rugosis, cordatis quinqueangulatis, crenatis. *Lam. ill. t. 581. f. 1.* Flores variantes. Majo. *Bienn.*

21. *ALTHÆA ficifolia* (*Altea werget el tin*), foliis inferioribus septem-lobo-palmatis obtusis, superioribus hastatis. *Lam. ill. t. 580. f. 2.* Flores variantes. Majo. In hortis. *Bienn.*

22. *ALYSSUM marittimum*, caulibus suffruticosis diffusis, foliis lineari-lanceolatis acutis subincanis, petalis integris, filamentis simplicibus, siliculis subrotundis. Flores albi. Januario. *Per.*

23. *AMARANTHUS Blitum*, glomerulis lateralibus, floribus trifidis triandris, foliis ovatis retusis, caule diffuso. Flores herbacei. Junio. In cultis riguis. *Ann.*

24. *AMARANTHUS caudatus* (*Dixiplina*), racemis pentandris, decompositis, cylindricis, pendulis longissimis. Blitum Majus, peruvianum *Clus. hist. 2. p. 81.* Floret Augusto. In hortis. *Ann.*

25. *AMBROSIA marittima* (*Mentna*), foliis multifidis, spicis solitariis pilosis, subsessilibus. *Sabb. hort. 7. t. 75.* Floret Augusto, in arvis maritimis. *Ann.*

26. *AMMI majus* (*Dakra*), caule angulato, foliis omnibus margine cartilagineo argute crenulatis, inferioribus pinnatis lanceolatis, superioribus multifidis linearibus. *Lam. ill. t. 139.* Flores albi. Junio. In campis. *Bienn.*

27. *AMYGDALUS comunis* (*Levz*), foliorum serraturis infimis glandulosis, floribus sessilibus, geminis. *Black. t. 105.* Floret Januario. *Arb.*

28. *AMYGDALUS Persica* (*Hawh*), foliorum serraturis

omnibus acutis, floribus sessilibus, solitariis. *Black. t. 101. Floret Martio. Arb.*

29. ANAGALLIS *arvensis* (*Harira hamra*) foliis ovatis subtus punctatis, caule procumbente. *Black. t. 43. Lam. t. 101. Sabb. hort. 2. t. 45. Flores punicei. Majo. In cultis. Ann.*

30. ANAGALLIS *carulea* (*Harira Kahla*) foliis lanceolato-ovatis caule erecto, corolla inciso-dentata.—*Sabb. hort. 2. tom. 46. Black. t. 274. Flores cyanei. Majo. In arvis. Ann.*

31. ANCHUSA *italica* (*Lsien el fart*), floribus subæqualibus, fauce barbatis, calycibus quinquefidis, fructiferis erectis, foliis lucidis strigosis. *Savi Mat. Med. t. 2. Floret Majo, in agris. Per.*

32. ANDRACNE *telephioides*, procumbens herbacea. *Lam. ill. t. 797. Bocc. Mus. 2. t. 119. Floret Septembri. Ann.*

33. ANDROPOGON *hirtus*, culmo ramoso, vaginis ramis ventricosis, spicis conjugatis, calycibus pilosis, flore hermaphrodito aristato, masculo mutico. *Bocc. Mus. 315. t. 8, f. 1. B: prod. p. 19. Floret Junio, in maritimis. Per.*

34. ANEMONE *pratensis*, pedunculo involucrato, petiolis apice reflexis, foliis bipinnatis. *Sabb. hort. 5. t. 33. Floret Januario, in agris. Per.*

35. ANETHUM *graveolens* (*Xibt*), fructibus compressis. *Sabb. hort. 5. t. 95. Matt. p. 799. Floret Junio, in arvis. Ann.*

36. ANETHUM *Fœniculum* (*Besbies*), fructibus gibbis, foliis caulinis numerosis deflexis. *Sabb. hort. 5. t. 81. Black. t. 288. Flores lutei. Junio. In aggeribus. Biennis.*

37. ANREDERA *vesiculosa* (*Fatàta*), foliis subcordatis, pedunculis simplicibus, fructibus orbiculato-compressis vesicariis. *Lam. ill. t. 215. f. 2. Floret Octobri, ubique communis. Per.*

38. *ANTHEMIS Cotula*, receptaculo conico; paleis setaceis, seminibus muticis, foliis bipinnatifidis glabriusculis. Chamæmelum foetidum, sive Cotula foetida. *Bauh. hist. 3. p. 120. l. 26.* Flores disco luteo, radio albo. Majo. *Ann.*

39. *ANTHOXANTHUM odoratum*, spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis, arista longioribus. *Curtis. Obs. t. 1. Floret Majo. Per.*

40. *ANTHYLLIS Hermanniae*, fruticosa, foliis ternatis lineari-cuneatis subpetiolatis, calycibus campanulatis, ramis spinescentibus. Aspalatus cretica *Linn. Genista Zann. t. 39. icon mala.* Flores lutei parvi. Aprili. In montibus *Wardiae. Frut.*

41. *ANTHILLIS vulneraria*, herbacea foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. Floret Majo. In pascuis. *Peren.*

42. *ANTIRRHINUM Cymbalaria*, foliis cordatis quinquelobis alternis glabris, caulibus procumbentibus. *Bull. t. 305.* Flores albidii violaceo striati. Martio. In rupibus. *Per.*

43. *ANTIRRHINUM Elatine*, caule procumbente foliis inferioribus ovatis oppositis, superioribus hastatis alternis, floribus axillaribus, pedunculis filiformibus folio longioribus, calycinis segmentis lanceolatis, calcari elongato attenuato. *Bull. 245. Black. t. 170.* Floret Junio; in arvis. *Ann.*

44. *ANTIRRHINUM spurium*, foliis ovatis alternis, caulibus procumbentibus. Floret Junio in arvis *Ann.*

45. *ANTIRRHINUM triphyllum*, foliis ternis ovatis. *Linaria hispanica Clus. hist. p. 320. Sab. hort. 3. t. 4.* Floret Februario, in campis. *Ann.*

46. *ANTIRRHINUM majus*, corollis ecaudatis, caule erecto, foliis lanceolatis oppositis alternisve, floribus racemosis, calycinis segmentis glanduloso-pilosis ovatis obtusis. *Bull. t. 277. Mill. ic. 42.* Floret Aprili, in muris. *Per.*

47. ANTIRRHINUM *Orontium*, corollis ecaudatis, floribus subspicatis; calycibus digitatis, corolla longioribus. Floret Junio, in arvis. *Ann.*

48. APIUM *graveolens* (*Karfüs*), foliolis caulinis cuneiformibus, caule sulcato. *Sabb. hort. 5. t. 67. Black. 443.* Floret Majo. *Bien.*

49. APIUM *Petroselinum* (*Torsìn*). foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Black. t. 172. Lam. t. 196. f. 1.* Floret Majo. *Bien.*

50. ARBUTUS *Unedo* (*Ubriagola*), caule arboreo foliis glabris serratis, bacca tuberculosa, loculis polyspermis. *Lam. ill. t. 366. Mill. ic. 48.* Floret Autumno. In hortis frequens. *Arb.*

51. ARENARIA *rubra*, foliis linearibus mucronulatis, stipulis scariosis vaginantibus, seminibus compressis angulatis scabriusculis. *Bauh. hist. 2. p. 2. p. 722.* Floret Majo, secus vias. *Ann.*

52. ARENARIA *tenuifolia* foliis subulatis acutis, caule paniculato, capsulis erectis trivalvibus; petalis lanceolatis calice brevioribus. *Lam. t. 378. f. 1.* Alsine etc. *Bauh. hist. 3. p. 364.* Floret Majo, secus vias. *Ann.*

53. ARMENIACA *vulgaris* (*Berqùq*), foliis subcordatis, stipulis palmatis. *Lam. ill. t. 431. Black. t. 281.* Floret Febr. *Arb.*

54. ARNOPOGON *picroides*, calicibus hispido-aculeatis, foliis runcinatis denticulatis, caulinis basi dilatatis. *Lam. ill. t. 646, f. 3.* Flores lutei. Majo. *Ann.*

55. ARTEMISIA *pontica* (*Erbabyanka*), foliis multipartitis, subtus tomentosus, floribus subrotundis, nutantibus, receptaculo nudo. Floret Junio, passim. *Suffrut.*

56. ARUM *maculatum* (*Tarni*), acaule, foliis hastato-sagittatis, lobis deflexis, spadice elevato spatha brevioribus. *Matt. p. 629.* Floret Martio. Ad muros. *Per.*

57. ARUM *Colocasia* (*3or3às*), acaulis foliis peltatis,

cordato-acuminatis repandis. *Clus. hist. 2. p. 75.*
 Floret Octobri. In aquosis. *Per.*

58. ARUM *Dracunculus*, caule recto maculato, foliis pedatis, spatha ovato-lanceolata, spadice lanceolato-lineariformi longiore *Bull. t. 73.* Dragontea, minore *Matt. p. 624.* Floret Majo, in umbrosis rara. *Per.*

59. ARUM *Arisarum* (*Arni tal' pipi*), foliis cordato-sagittatis obtusis, spatula cucullato-cilindracea, apice obtusiuscula, spadice tereti incurvo solido. *Sabb. hort. 2. t. 79. Clus. hist. 2. p. 73.* Flores luteo-virides. Februario. In arvis. *Per.*

60. ARUNDO *Donax* (*Qasab*), calycibus quinquefloris, panicula diffusa, culmo fruticoso. Floret Septem. in vallibus. *Per.*

61. ASCLEPIAS *fruticosa*, foliis revolutis, lineari-lanceolatis; caule fruticoso. Floret Junio, in hortis frequens. *Bienn.*

62. ASPARAGUS *acutifolius* (*Spræg*), caule inermi, angulato fruticoso, foliis aciformibus rigidulis, perennantibus mucronatis æqualibus. *Corruda prior. Clus. hist. 2. p. 178.* Floret Sept. in incultis. *Per.* Turiones comeduntur.

63. ASPHODELUS *ramosus* (*Berwieg*) caule nudo ramoso, bracteis angustis triangulo-subulatis, pedicillo subæqualibus, foliis carinatis. *Lam. t. 241 f. 2. Sabb. hort. 6. f. 43. Black. 238.* Floret Febr. In pasquis. *Per.*

64. ATRIPLEX *patula*, caule herbaceo patulo, foliis deltoideo-lanceolatis, subhastatis, calycibus seminum disco submuricatis. Floret Junio. *Marsæ. Ann.*

65. AVENA *sativa* (*Hafür*), paniculata calycibus dispermis, seminibus lævibus, altero aristato. *Lam. ill. t. 47 f. 2. Black. t. 422.* Floret Aprili, inter segetes. *Ann.*

66. BALLOTA *nigra*; caule erecto, foliis ovato-crenatis, verticillis multifloris pedunculatis. *Bull. t. 397.*

Sab. hort. 3. t. 35. Black. t. 136. Floret Majo, in incultis. Per.

67. *BELLIS sylvestris (Marrerita Selvagga)*, scapo nudo unifloro, foliis obovatis, subintegris, trinerviis. *Bellis Sylvatica. B. hist. 3. p. 114. Matt. pag. 961. Floret Septem. Octobri. Per.*

68 *BELLIS annua*, caule ramoso folioso, foliis subovatis petiolatis, pedunculis axillaribus terminalibusque longissimis unifloris. *Bocc. Mus. t. 35. Mich. t. 29. Flores radio albo, disco luteo. Februario. Ann.*

69 *BETA Cicla (Selq)* floribus ternis, foliis radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus, spicis lateralibus longissimis. *Floret Aprili. Bien.*

70. *BETA vulgaris (Betravi)*, floribus congestis. *Black t. 235. Lam. ill. t. 182 f. 2. Floret Martio, colitur in arvis. Bienn.*

71. *BETA marittima*, floribus geminis. *Lam. ill. t. 182 f. 1. Floret Martio, in locis marittimis Ann.*

72. *BISCUTELLA apula*, siliculis scabris, foliis lanceolatis sessilibus serratis. *Sabb hort. 4. t. 10. Clus. hist. 2. p. 133. Floret Martio, secus vias Ann.*

73. *BORAGO officinalis (Fedloqqom)*, foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Sabb. hort. 2. t. 20. Black. t. 36. Floret Martio. Ann.*

74. *BRASSICA oleracea (Kromb)*, radice caulescente tereti carnosa, foliis lævibus glaucis repandis lobatisque. *Floret Martio Annua.*

75. *BRASSICA Napus (Nevev)*, radice caulescente, fusiformi, fol. lævibus; superiorib. cordato-lanceolat. amplexicaul: inferiorib: lyrat. dent. *J. B. 2. p. 842. Floret Februario. Colitur in hortis. Bien.*

76 *BRASSICA Eruca (Aruka)*, foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis glabris. *Bull. t. 313, Sabb. hort. 4. t. 33. Flores albi. In hortis sponte. Ann.*

77. *BRIZA media*, spiculis ovatis septemfloris, calyce flosculis brevior, stipula brevissima obtusa.

Lam. t. 45. f. 1. Floret Aprili, Majo, in pasquis.
Perennis.

78. *BROMUS diandrus*, panicula erecto-patente, subramosa, flosculis lanceolatis, nervosis sulcatis, dian-drus. Floret Majo. *Ann.*

79. *BROMUS barbatus*, culmo basi geniculato, foliis subconvolutis, panicula spiciformi contracta, pedunculis simplicibus compressis: valva altera minima; glumis apice aristatis, margine barbato-ciliatis. *Sebast. Fasc. 2 t. 1.* Floret Majo, circa Portus Littora. *Ann.*

80. *BUPHTALMUM spinosum*, foliis alternis oblongo-lanceolatis, amplexicaulibus integerrimis hirsutis, calycibus foliosis mucronatis. *Black. t. 272.* Floret Junio secus vias. *Ann.*

81. *BUPLEURUM rotundifolium*, involucrio universali nullo, foliis perfoliatis, subrotundo-ovatis, involu-cellis foliolis mucronatis. *Sabb. hort. 5. t. 78. Black. t. 95. Lam. ill. t. 189. f. 1.* Floret Aprili inter segetes. *Ann.*

82. *BUXUS sempervirens* (*Bux*), foliis ovatis, petiolis margine pilosiusculis, antheris ovato-sagittatis, *Black. t. 196. Bull. t. 263. Lam. t. 761. f. 1. 2.* Floret Januario, in hortis frequens. *Frut.*

73. *CACTUS Opuntia* (*El Baytar ta l'Indya*), articulato-prolifer laxus, articulis ovatis compressis, spinis setaceis, floribus luteis. *Lam. ill. t. 414. Sabb. hort. 4. t. 68.* Floret Majo, passim. *Arb.* Var: fructu pulpa sanguinea, & fruct. pulp. alba, ex qua utitur pro alimento Coeci Cacti, *Koccinilya* vulgo.

84. *CALENDULA officinalis*, seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Black. t. 108. Bauh. hist. 3. lib. 26. p. 101.* Floret Januario in hortis. *Ann.*

85. *CALENDULA arvensis* (*El Soffeyra*), seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis, exterioribus lan-

ceolato-subulatis dorso muricatis. *Caltha minima*.
Bauh. hist. 3 p. 123. *Bull. t.* 239. *Black. t.* 106.
 Flores citrini Aprili In arvis. *Ann.*

86. *CAMPANULA Erinus*, caule dicotomo, foliis sessilibus ovatis, profunde dentatis, superioribus oppositis, floribus solitariis axillaribus subsessilibus. *Col. Phyt.* 2. p. 29 t. 31. Flores albo-cerulei. Aprili. *Ann.*

87. *CANNA indica* (*Kokkie*), foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. *Sabb. hort.* 6. t. 79. Floret Junio, communiter colitur. *Per.* "Nostrates ex seminibus globulos præcatorios formant"

88. *CANNABIS sativa* (*Qanneb*), foliis digitatis. *Black. t.* 322. *Mill. ic.* 77. Floret Majo, in hortis sponte. *Ann.*

89. *CAPPARIS spinosa* (*Kappâr*), pedunculis unifloris solitariis, stipulis spinosis caducis, foliis subrotundis obtusis, glabris, capsulis ovalibus. *Lam. ill. t.* 446. Flores candidi Junio, in mœnibus, *Suffrut.*

90. *CAPSICUM annum* (*Bzâr ahmar*), caule herbaceo pedunculis solitariis. *Black. t.* 129. Floret Junio. *Ann.*

91. *CAPSICUM grossum* (*Bzâr ahdar*), caule suffrutiscente, fructibus incrassatis, variis. *Sab. hort.* 2. t. 66. Floret Junio. *Rien.*

92. *CARDAMINE hirsuta*, foliis petiolatis extipulatis, foliolis petiolatis, inferioribus subrotundis, superioribus lanceolatis. Flores albi. Februario; in agris. *Ann.* "Planta adspectu, glabra. Vix cilia in inferiori petiolorum parte deprehendantur. Staminum numerus facile variat."

93. *CARDUUS marianus*, foliis amplexicaulibus, sinuato-pinnatifidis, glabris, spinosis; squamis calycinis lanceolatis, foliaceis, refractis, margine spinosis, spina terminali valida. *Black. t.* 79. Flores purpurei. Majo. *Ann.*

94. *CARDUUS pycnocephalus* (*Horfox*), foliis decurrentibus, pinnatifido-sinuatis, pubescentibus, spino-

sis, pedunculis nudis, tomentosis; calycibus subcylindricis, aggregatis. Flores purpurei. Majo. *Ann.*

95. *CARTHAMUS tinctorius* (*Zosfor*), foliis ovatis, integris, serrato-aculeatis. *Bot. Regis. t. 170.* *Cnicus Clus. hist. 2. p. 152.* Flores crocei, Majo. *Ann.*

96. *CARTHAMUS lanqrus*, caule lanuginoso corymboso, foliis inferioribus pinnatifidis, superioribus amplexicaulibus, squamisque calycinis exterioribus pinnatifido-dentatis spinosis. *Black. t. 468.* Floret Junio. In incultis. *Ann.*

97. *CAUCALIS nodosa*, W. umbellis lateralibus simplicibus subsessilibus, caule prostrato. *Caucalis nodoso echinato semine. Bauh. hist. 3. part. 2. p. 83.* Flores albi. Majo. *Ann.*

98. *CELOSIA cristata* (*Bellus*), foliis oblongo-ovatis, pedunculis teretibus substriatis, spicis oblongis. *Lam. ill. t. 168 f. 1.* Flores rubri Julio. In hortis. *Ann.*

99. *CELSIA cretica*, foliis radicalibus lyratis, superioribus oblongis, floribus subsessilibus longitudine bractearum, calycibus ovatis serratis. Flores flavi, fundo superiore maculis duabus ferrugineis. Junio in *Gaulo. Bien*

100. *CENTAUREA melitensis*, calycibus palmato-spinosis confertis sessilibus, spinis rectis, foliis lanceolatis scabris decurrentibus, inferioribus subdentatis, radicalibus sinuatis. Flores flavi. Junio. Secus vias. *Ann.*

101. *CENTAUREA solstitialis*, floribus solitariis, terminalibus; calycibus duplicato-spinosis, foliis decurrentibus, inermibus, lanceolatis; radicalibus lyratis. Flores lutei. Junio. *Ann.*

102. *CENTAUREA spathulata*, Nob: calycibus ovatis lævibus inermibus, squamis lanceolatis scarioso-elasticeis integris, inferioribus apice coloratis, foliis spathulatis integerrimis, glabris, crassiusculis. Flores purpurei, vel albi, Majo, Augusto, in collibus marittimis. *Per.*

103. *CERASTIUM vulgatum*, hirsutum foliis ovatis,

petalis calyci æqualibus; floribus pedunculo longioribus; capsulis oblongis; caulibus diffusis. *Lam. ill. t. 392. f. 1.* Flores albi. *Ann.*

104. CERASTIUM *campanulatum*, ascendens, diffusum, villosum; foliis radicalibus spathulatis, caulinis oblongis; panicula dichotoma; corollis campanulatis; petalis semi-bifidis, calyce durulo longioribus. *Sebast. fasc. 2. t. 3.* Floret Majo. *Ann.*

105. CERATONIA *Siliqua* (*Harrùb*), foliis 3-6-jugis, coriaceis, floribus spicatis. *Lam. t. 859. Black. 209.* Floret Octobri. Passim. *Arb.*

106. CERINTHE *aspera*, corollis obtusis patulis, cylindricis, staminibus corollæ æqualibus, foliis asperis. *Lam. ill. t. 93. Sabb. hort. 1. t. 12. Mill. ic. 91.* Floret Aprili, in incultis. *Ann.*

107. CHÆROPHYLLUM *sativum*, Pers. (*Sorfo'ya*), seminibus lævibus; umbellis lateralibus subsessilibus; involucrio univetsali filiformi. *Lam. ill. t. 201. f. 1. Black. f. 236.* Floret Martio, sponte in hortis. *Ann.*

108. CHAMEROPS *humilis* (*Gummàr*), frondibus palmatis, plicatis, stipitibus spinosis. *Lam. ill. t. 900.* Habitat in *Marfa*. *Frut.*

109. CHEIRANTHUS *incanus* (*Gizi kommuni*), foliis lanceolatis obtusis integerrimis incanis, siliquis apice simplicibus obtusis: caule fruticoso. *Sabb. hort. 4. t. 26.* Floret Aprili, in rupium fissuris. *Frut.*

110. CHEIRANTHUS *Cheiri* (*Gizi esfar*), foliis lanceolatis, acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso. *Black. t. 179. Bull. t. 349.* Flores aurei, Martio. *Frut.*

111. CHEIRANTHUS *tricuspidatus*, foliis lyratis, siliquis apice tridentatis. *Sabb. hort. 4. t. 25.* Floret Majo, in marittimis. *Ann.*

112. CHELIDONIUM *Glaucium*, caule glabro, pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis, radicalibus pinnatifidis, siliqua scabriuscula. *Sabb. hort. 4. t. 86.* Floret Aprili, in marittimis. *Per.*

113. CHENOPODIUM *rubrum*, foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis, caule brevioribus. Atriplice III. *Matt. p.* 490. Floret Junio. *Per.*

114. CHENOPODIUM *viride* (*Zobbeira hadra*), foliis rhomboideis, dentato-sinuatis; racemis ramosis, subfoliatis. *Vall. pars.* 36. t. 7. f. 1. *Bauh. hist.* 2. p. 972.

115. CHENOPODIUM *Ambrosioides* (*Tefalts*), foliis lanceolatis; racemis foliatis, simplicibus. Floret Junio, secus vias. *Ann.* Herba Theæ succedanea.

116. CHENOPODIUM *Vulvaria* (*Zobbeira Nettiena*), foliis rhombeo-ovatis subintegerrimis, floribus conglomeratis axillaribus, caule diffuso. *Bull. t.* 323. *Black. t.* 100. Flores herbacci, Junio. *Ann.*

117. CHENOPODIUM *marittimum* (*Zobbeira talrmied*), foliis glabris subulatis carnosis semiteretibus; floribus glomeratis axillaribus. Floret Septembri, in marittimis. *Ann.*

118. CHIRONIA *Centaurium* (*Centawrya*), caule herbaceo dichotomo paniculato, foliis ovato-lanceolatis, calyce tubo brevioris. Gentiana *Bull. t.* 253. *Sabb. hort. 1. t.* 99. Floret Junio, in sterilibus. *Ann.*

119. CHLORA *perfoliata*, foliis perfoliatis. *Lam. t.* 296. f. Floret Majo, apricis calcareis. *Ann.*

120. CHRYSANTHEMUM *coronarium* (*Lellux*), foliis pinnatis, incis, extorsum latioribus. Chrys. creticum. *Clus. hist. 1. p.* 334. Floret Martio. *Ann.*

121. CHRYSANTHEMUM *indicum*, foliis subpalmatis sinuato-trilobis dentatis stipulatis, caule ramoso, ramis unifloris, calycinis squamis rotundatis. *Bot. Reg. t.* 4. Floret Octobri. Communiter in hortis. *Per.*

122. CICER *arietinum* (*Cicri*), foliolis serratis. *Lam. t.* 632. *Sabb. hort. 7. t.* 10. Floret Majo, seritur in hortis. *Ann.*

123. CICHORIUM *Intybus* (*Cikweyra*), floribus ge-

minis sessilibus, foliis runcinatis. *Black. t. 177.* Floret Junio, in agris, & secus vias. *Ann.*

124. CICHORIUM *Endivia*, pedunculis axillaribus geminis, altero elongato unifloro, altero brevissimo subquadrifloro, floribus capitatis, foliis oblongis denticulatis, ramis flexuosis. *Black. t. 378.* Floret Majo, in hortis. *Ann.*

125. CICHORIUM *spinosum* (*Qanfùda*), floribus axillaribus solitariis, caule dichotomo, ramis nudis spinoscentibus, foliis lanceolatis runcinato-dentatis. *Bauh. prodr. t. 62. Clus. hist. 2. p. 145.* Floret Junio, in sterilibus. *Per.*

126. CINERARIA *marittima* (*Kromb el bahar*), floribus paniculatis, foliis pinnatifido-sinuatis, supra viridibus pubescentibus, subtus niveo-tomentosis, caule frutescente. *Jacobæa marina* sive *Cineraria J. B. hist. 2. p. 1056.* Flores lutei, Junio, in rupium fissuris. *Perennis.*

127. CITRUS *medica* (*Trong*), petiolis linearibus, foliis ovatis acuminatis. *Bl. t. 361.* Floret Martio. *Arb.*

128. CITRUS *medica* b. *Limon* (*Xkomp, Lami, Cetrat, Bergamott*). *Lam. t. 639. f. 2. Black. t. 362.* Floret Martio. *Arb.*

129. CITRUS *Aurantium* (*Laring*), petiolis alatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis. *Lam. ill. t. 639. f. 1. Black. t. 349.* Floret Martio. *Arb.*

130. CLEMATIS *balearica*, Enc: involuero calycino, foliis ternatis, foliolis laciniatis acutis, petalis quatuor sericeis. Floret Octobri, ad maceries. *Suffrut.*

131. CNICUS *syriacus*, caule ramoso, foliis semiamplexicaulibus, auriculatis oblongis, pinnatifidis spinosis, albo-venosis utrinque glabris, floribus capitato-glomeratis axillaribus subsessilibus, bracteatis, squamis calycinis oblongo-lanceolatis, mucronatis patentibus. *Sebast. fasc. 2. t. 6.* Floret Majo, secus vias. *Ann.* Similis *Carduo mariano*.

132. *Coix Lachryma*, culmo superne semitereti obtuso, floribus nudis, fructibus ovatis. *Lam. ill. t. 750.* Floret Julio, in hortis. *Per.*

133. *COLCHICUM montanum (Busieq)*, foliis linearibus patentissimis. *Clus. hist. p. 200.* Floret Octobri, in collibus. *Per.*

134. *CONIUM maculatum (Cikuta)*, seminibus inerribus, caule ramosissime nitido maculato. Floret Majo, *Bien.*

135. *CONVOLVULUS arvensis (Leblieb)*, caule volubili, foliis sagittatis, utrinque acutis, pedunculis subunifloris. *Bull. t. 269. Zan. t. 40.* Flores albi. Majo. In agris. *Per.*

136. *CONVOLVULUS Althæoides*, caule volubili, foliis inferioribus cordatis sinuatis, superioribus pinnatifidolobatis, subpalmatis, pedunculis plerisque bifidis. *Clus. hist. 2. p. 49.* Floret Majo, in arvis. *Per.*

137. *CORIANDRUM sativum (Kosbor)*, fructibus globosis, seminibus hemisphaericis. *Lam. ill. t. 196. f. 1. Sabb. hort. 5. t. 92. Black. t. 176.* Floret Majo, in agris. *Ann.*

138. *CORIANDRUM testiculatum (Bumneyher)*, fructibus didymis. *Lam. ill. t. 196. f. 2.* Floret Majo, in agris. *Ann.*

139. *CORONILLA valentina*, fruticosa, foliis subnovenis; stipulis suborbiculatis. *Miller. ic. 107.* Floret Februario, in collibus. *Frut.*

140. *CORONILLA Emerus*, fruticosa, pedunculis subtrifloris, corollarum unguibus calice triplo longioribus; caule angulato. *Mill. ic. 132.* Flores lutei. Martio, habitat cum præcedente. *Frut.*

141. *CORONOPUS Ruelli*, siliculis integris, cristato-muricatis, stylo porrecto, corymbis paucifloris. *Lam. ill. t. 558. Black. t. 120.* Floret Majo, secus vias. *Ann.*

142. *CORYLUS Avelana (Gelleuz)*, stipulis oblongis obtusis, calycibus fructus campanulatis apice patulis



lacero-dentatis, foliis subrotundis cordatis acuminatis. *Lam. ill. t. 780.* Hospitatur in hortis, rara. *Arb.*

143. *COTYLEDON Umbellicus* (*Zokret l'azguza*), foliis peltatis, crenatis, caule spicato subsimplici, floribus pendulis, radice tuberosa. *Lam. ill. t. 389. f. 1. Black. t. 263.* Floret Majo. In muris humidis. *Per.*

144. *COTYLEDON orbicularis* (*Segret el kalli*), foliis ovato-spatulatis obtusis cum acumine, lævibus; floribus paniculatis. Floret Junio. *Frut.*

145. *CRESSA cretica*, corollis imberb.; capsulis monosp.: *Lam. ill. t. 183.* Fl. Julio, ad maris littora. *Ann.*

146. *CRITHMUM marittimum*, foliolis lanceolatis, carnosis. *Lam. ill. t. 197. Sabb. hort. 5. t. 94.* Floret Augusto, ad muros agrorum marittim. *Per.*

147. *CROCUS sativus* (*Zasfràn*), stigmatibus exerto tripartito: segmentis linearibus. *Lam. t. 30. f. 1. Sabb. hort. 6. t. 54. Black. 144. Mill. ic. 111.* Floret Octobri, in sterilibus. *Per.*

148. *CROTON tinctorium* (*Turnesol*), foliis ovato-rhombeis repandis basi integerrimis utrinque canis, pedunculis terminalibus subtrifloris, capsulis squamato-pubescentibus pendulis. *Niss. Act. par. 1712.* Floret Augusto, inter gossypium. *Ann.*

149. *CUCUBALUS Behen* (*Qasqayza*), calycibus subglobosis, glabris, reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. *Lam. ill. t. 377. f. 2. Bull. t. 321.* Floret Aprili, ad agrorum margines. *Per.*

150. *CUCUMIS sativus* (*Hyàr*), foliorum angulis rectis; pomis oblongis, scabris. *Sabb. hort. 1. t. 63. Black. t. 4.* Floret Aprili, in agris. *Ann.*

151. *CUCUMIS Melo* (*Bettih*), foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. *Sabb. hort. 1. t. 63. Black. t. 329.* Floret Majo. In agris. *Ann.*

152. *CUCURBITA Pepo* (*Qara Xitwi*), foliis lobatis, pomis lævibus. *J. B. 2. p. 221.* Cuc. maxima. *Lam.* Flores lutei. Majo. In agris. *Annua.*

153. CUCURBITA *Citrullus* (*Dolliez*), foliis multipartitis. *Sabb. hort. 1. t. 68. Black. t. 157.* Floret Junio.

154. CUCURBITA *leucantha* Enc: (*Qaraz twil*), foliis subangulatis, tomentosis, basi subtus biglandulosis; pomis lignosis. *Sabb. hort. 1. t. 69. Lam. 2. p. 150.* Flores albidii, Junio, in riguis. *Ann.*

155. CUMINUM *Cuminum* (*Kemmün*), *Lam. ill. t. 194.* Floret Majo, in agris. *Ann.*

156. CUPRESSUS *sempervirens* (*Cipress*), foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Black. t. 127.* Floret Martio. *Arb.*

157. CUSCUTA *europæa*, floribus subsessilibus, corolla fauce nuda, stigmatibus acutis. *Lam. ill. t. 88.* Floret Junio, parasitica in scilla, &c. *Ann.*

158. CYNARA *Scolimus* (*Qaqoc*), foliis pinnatis indivisisque; calycis squamis ovatis. *Sabb. hort. 7. t. 78. Black. t. 458.* Floret Junio. *Per.* Turiones *Tsannür* nomine veneunt.

159. CYNOGLOSSUM *officinale* (*Lsien el Kelb*), caule erecto folioso, foliis inferioribus lato-lanceolatis basi attenuatis, superioribus basi latioribus acutis pubescenti-tomentosis, racemis ebracteatis, durante florescentia, paniculatis, staminibus inclusis, fructibus ovatis planis. *Black. t. 249. Lam. t. 92. f. 1.* Floret Majo, secus vias. *Per.*

160. CYNOMORIUM *coccineum* (*Berg el Generäl*), stipite squamoso, amento cylindraceo, squamis imbricatis, ovatis retusis. *Lam. ill. t. 742. Mich. t. 12.* Floret Aprili, habitat in marittimis prope *Hal Dinli*. *Ann.*

161. CYNOSURUS *cristatus*, bracteis pinnato-distichis muticis, spica simplici lineari. *Curt. Obs. t. 6.* Floret Junio, in pasquis. *Per.*

162. CYPERUS *longus* (*Sozda*), culmo triquetro nudo inferne folioso, umbella multifida decomposita patente, spicis lineari-lanceolatis compressis, involucrio longissimo. Floret Junio, ad fossas. *Per.*

163. *CYPERUS esculentus* (*Habb 3aziz*), culmo triquetro, nudo; umbella foliosa; radicum tuberibus ovatis, zonis imbricatis. Floret Junio. *Per.*

164. *DAUCUS Carota* (*Sfonmaria*), fructibus hispidis, petiolis subtus nervosis, umbellis fructiferis concavis. *Lam. t. 192. f. 1. Sabb. hort. 5. t. 74.* Flores albidi. Majo. *Bien.*

165. *DELPHINIUM Ajacis* (*Piedalwett*), nectariis monophyllis, caule simplici. *Sabb. hort. 7. t. 60.* Floret Majo, in hortis. *Ann.*

166. *DELPHINIUM peregrinum* (*Sieg el hamiema*), nectariis diphyllis, corolla enneapetala, foliis multipartitis obtusis. *Consolida B. prod. t. 74.* Flores cærulei. In arvis. *Ann.*

167. *DELPHINIUM Staphisagria*, floribus calcare brevissimo obtuso, petalis quatuor apice integris, foliis palmatis, lobis lanceolatis. *Black. t. 265.* Floret Majo. *Bien.* Semen hujus, vulgo *Zerrizet el Qamel* appellatur.

168. *DIANTHUS Caryophyllus* (*Qronfol*), floribus solitariis squamis calycinis subrombeis brevissimis, petalis crenatis imberbibus, foliis lineari-subulatis canaliculatis glaucis. *Lam. ill. t. 376. f. 1. Black. t. 85. Mill. ic. 121.* Flores variantes, Majo. *Per.*

169. *DIANTHUS chinensis*, floribus solitariis, squamis calycinis subulatis, patulis, tubum æquantibus; corollis crenatis. *Act. Paris. 1705. f. 5. Mill. ic. 81. f. 2.* Floret Majo. *Ann.*

170. *ECHIUM vulgare*, caule tuberculato hispido, foliis caulinis lanceolatis hispidis, spicis lateralibus pilosis deflexis. *Clus. hist. 2. p. 163. Black. t. 229.* Floret Majo. *Bien.*

171. *ECHIUM creticum*, caule procumbente, calycibus frutescentibus distantibus. *Clus. hist. 2. p. 165.* Floret Majo. *Ann.*

172. *EPILOBIUM virgatum*, foliis oppositis oblongo-lanceolatis denticulatis sessilibus; caule subtereti

virgato. *Lam. t. 278. f. 4.* Floret Junio, secus fossas. *Perenne.*

173. *EQUISETUM fluviatile (Demb el Ziemel)*, scapo simplici, vaginis approximatis setaceo-multifidis; caule sterili ramoso, ramis scabriusculis numerosissimis, fere semper simplicibus. *Black. t. 217. f. 2. Coda di cavallo. 1. Mat. p. 1080.* Floret Martio, secus *Marsæ* fossas. *Per.*

174. *ERICA multiflora*, antheris muticis exertis, corollis cylindricis; stylo exerto, foliis quinis, floribus sparsis. *Bauh. hist. 1. p. 356.* Floret Januario, in valibus. *Frut.*

175. *ERIGERON graveolens (El Za₃zie₃a)*, foliis sublinearibus integerrimis, ramis superioribus unifloris, inferioribus multifloris. Flores lutei Septembri. *Ann.*

176. *ERIGERON canadense*, caule hirtio floribusque paniculatis, foliis lanceolatis; inferioribus dentatis. Flores luteoli; Augusto. *Per.*

177. *ERODIUM moschatum*, caule procumbente, pedunculis multifloris, petalis æqualibus calyce majoribus, foliis pinnatis, foliolis subpetiolatis basi inæqualibus oblongis inciso-dentatis. *Black. t. 150.* Flores purpurascens. Aprili. *Ann.*

178. *ERODIUM malacoides*, caule declinato, foliis cordatis sublobatis obtusis, pedunculis multifloris. Geranio sexto *Matt. p. 907.* Flores purpurascens. Martio. *Ann.*

179. *ERVUM Lens (Zads)*, pedunculis subbifloris, seminibus compressis, convexis. *Lam. t. 634. f. 1.* Flores albescentes. Majo. *Ann.*

180. *ERVUM Ervilia (Zofsfa)*, germinibus undatoplicatis, foliis impari-pinnatis. *Lam. t. 634. f. 3. Black. t. 208. f. 3.* Flores albescentes venis violaceis. Majo. *Ann.*

181. *ERYNGIUM marittimum*, foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, superioribus lobatis palmatis

amplexicaulibus rigidis, involucris amplis capitula ovata superantibus, caule decumbente ramoso, paleis tricuspидatis. *Sabb. hort. 6. t. 17.* Floret Junio, in arenosis. *Per.*

182. *ERYSIMUM officinale (Bsimā)*, caule recto, ramis patentibus subrectangulis, foliis runcinatis, siliquis cauli adpressis. *Sabb. hort. 4. t. 37. Black. t. 28.* Flores lutei. Majo. Ad vias. *Ann.*

183. *EVAX pygmæa*, caule basi ramoso, bracteis obovatis. *Lam. ill. t. 694. f. 1.* Fl: Junio, in apricis. *Ann.*

184. *EUPHORBIA Chamesice (Gemmūza)*, dichotoma, foliis subrotundis crenulatis glabris: floribus axillaribus caulibus procumbentibus. *Clus. hist. 2. p. 189.* Floret Junio, inter gossypium. *Ann.*

185. *EUPHORBIA Peplis*, dichotoma, foliis semicordatis integerrimis; floribus axillaribus solitariis, caulibus procumbentibus. *Clus. hist. 2. p. 187.* Floret Augusto, in marittimis rara. *Ann.*

186. *EUPHORBIA Peplus*, umbella trifida dichotoma, involucellis ovatis, foliis obovatis, integerrimis petiolatis. *Matt. p. 1323.* Floret in cultis oleraceis. *Ann.*

187. *EUPHORBIA segetalis (Tenzūd)*, umbella quinquefida dichotoma, involucellis cordatis acutis: foliis lineari-lanceolatis, superioribus latioribus. Floret Majo, passim. *Ann.*

188. *EUPHORBIA helioscopia*, umbella 5-fid. 3-fid. dichotoma: involucellis obovatis; foliis cuneiformibus serratis. Floret Martio, in cultis. *Ann.*

189. *EUPHORBIA Cyparissias*, umbella multifida, dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, foliis setaceis, caulinis lanceolatis. Floret Aprili. *Per.*

190. *EUPHRASIA officinalis*, foliis ovatis, obtuse dentatis, laciniis labii corollæ inferioris emarginatis. *Bull. t. 233. Black. t. 427.* Floret Majo, inter segetes. *Ann.*

191. *FAGONIA cretica*, spinosa, foliolis lanceolatis planis lævibus. *B. prodr. 142.* Floret Junio. *Ann.*

192. FERULA *communis* (*Ferla*), foliis linearibus, longissimis, simplicibus. *Lam. t. 205. t. 1. Sabb. hort. 6. t. 5.* Flores lutei, Martio. *Bien.*

193. FESTUCA *pratensis*, panicula secunda erectiuscula laxa, spiculis linearibus compressis obtusiusculis; flosculis cylindraceis obsolete nervosis. *Curt. Obs. t. 5.* Floret Majo. *Per.*

194. FICUS *Carica* (*Tin, Dokkàr*), foliis palmatis. *Lam. t. 861. Black. t. 125.* Floret Junio. *Arb.*

195. FRAGARIA *vesca* (*Frawli ta l'ekel*), calyce fructus reflexo, pubescentia petiolorum patentissima, pedunculorum adpressa. *Lam. ill. t. 442. Black. t. 77.* Floret Aprili. *Per.*

196. FRANKENIA *pulverulenta*, foliis obovatis retusis, subtus pulveratis. *Antyllis &c. Clus. hist. p. 186.* Floret Aprili. *Ann.*

197. FRAXINUS *excelsior* (*Fraxnu*), foliolis serratis, floribus calyce corollaque destitutis. *Black. 328. Mich. t. 103.* Floret Martio. Ante sacellum. *B. V. tal Hlas*, individuum memorabile. *Arb.*

198. FUMARIA *officinalis* (*Dohhanet l' Ard*), siliculis globosis, monospermis, laciniis foliorum latiusculis, subspatulatis, calycibus denticulatis. *Bull. t. 189. Sabb. hort. 7. t. 54. Black. t. 37.* Flores purpurei apice alborubri. Martio. *Ann.*

199. FUMARIA *capreolata*, siliculis globosis monospermis, foliis scandentibus subcirrhosis, laciniatis, acutis, calycibus denticulatis. *Lam. ill. t. 597. f. 1.* Flores albi, apice albo-purpurei. Martio. *Ann.*

200. GALIUM *Aparine* (*Harxaya*), foliis octonis obovato-lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, caule flaccido, geniculis villosis, fructibus hispidis. *Lam. ill. t. 60. f. 3. Bull. t. 315.* Flores albidii, Aprili. *Ann.*

201. GERANIUM *molle*, pedunculis 2-floris folio longioribus, foliis reniformibus, radicalibus novemlo-

bis, caulinis septemlobis trifidis, petalis 2-fidis calyce longioribus, arillis glabris transversim rugosis. Floret Aprili, in agris. *Ann.*

202. GEROPOGON *glabrum*, foliis glabris. *Lam. ill. t. 646.* Floret Majo, in regione *Mistræ.* *Ann.*

203. GLADIOLUS *communis* (*Habb el Qamh*), corollis subringentibus, laciniis spatulatis, spathis tubo longioribus, floribus secundis, foliis ensiformibus. *Lam. t. 32. f. 1. Bull. t. 8.* Floret Martio. *Per.*

204. GLECOMA *hederacea* (*Edera terrestri*), foliis reniformibus crenatis. *Matt. p. 663.* Flores purpureo-violacei, Majo. *Per.*

205. GNAFALIUM *orientale*, subherbaceum, foliis lineari-lanceolatis sessilibus; corymbo composito, pedunculis elongatis. *Elichrys. Lam. ill. t. 693. f. 1. Mill. ic. 131. f. 1.* Floret Junio. *Per.*

206. GOMPHRENA *globosa*, caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis solitariis pedunculis diphyllis. *Sabb. hort. 7. t. 99. Mill. ic. 21. f. 1.* Floret Junio. *Ann.*

207. GOSSYPIUM *herbaceum* (*Qoton abyad*), foliis quinquelobis mucronatis subtus uniglandulosi, caule herbaceo levi. *Black. t. 354. 357.* Floret Junio. *Bien.*

208. GOSSYPIUM *religiosum* (*Qoton ahmar*), foliis superioribus trilobis, inferioribus quinque-lobis, ramulis petiolisque nigropunctatis, calyce exteriori subtriphylo, seminibus nigris lana colorata adhærentibus. Floret Julio. *Frut.*

209. HEDERA *Helix* (*El Liedna*), foliis ovatis 3-5-angularibus, floralibus ovatis acuminatis venosis; umbellis erectis. *Lam. ill. t. 145. Bull. t. 133.* Flores luteo-virides, Octobri. *Arb.*

210. HEDYPNOIS *monspeliensis*, Wild. caule diffuso, ramoso, foliis oblongis, dentatis, basi attenuatis sessilibus; squamis calycinis fructigeris, glabris. *Hyoseris hedypnois* L. Flores lutei. Aprili. *Ann.*

211. HEDYSARUM *coronarium* (*Silla*), foliis pinnatis,

leguminibus articulatis, aculeatis, nudis rectis; caule diffuso. *Sabb. hort. 7. t. 30.* Floret Martio, in agris communis. *Per.*

212. *HELIANTHUS annuus* (*Ward el Xemx*), foliis omnibus cordatis trinerviatis, pedunculis incrassatis, floribus cernuis. Floret Junio. *Ann.*

213. *HELIOTROPIUM europæum*, foliis ovatis integerrimis tomentosissimis rugosis, spicis conjugatis, caule erecto herbaceo. *Lam. ill. 91. f. 1. Sabb. hort. 2. t. 33.* Flores albi, Junio. *Ann.*

214. *HELIOTROPIUM peruvianum* (*Vaynilya*) foliis lanceolato-ovatis, caule fruticoso, spicis numerosis aggregato-corymbosis. *Mill. ic. 243.* Floret Junio. *Frut.*

215. *HELMINTIA echioides*, Will, caule erecto ramoso, foliis oblongis amplexicaulibus undique aculeatis, calycis exterioris foliolis cordatis, interioribus infra apicem aristatis, pinnato-spinulosis. *Lam. ill. t. 648. Picris Lin.* Flores lutei, Junio, in arvis. *Ann.*

216. *HERNIARIA glabra* (*Kusksùa*), glomerulis multifloris. *Bauh. hist. 3. p. 378.* Floret in apricis. *Ann.*

217. *HERNIARIA hirsuta*, glomerulis paucifloris. *Bauh. 3. p. 379.* Floret Junio. In incultis frequens. *Per.*

218. *HIPPOCREPIS multisiliquosa*, lomentis pedunculatis confertis circularibus, margine altero lobatis. *Sabb. hort. 7. t. 29. Mill. ic. 151.* Floret Majo. *Ann.*

219. *HOLCUS Sorgum* (*Qarabocc*), panicula coartata ovali, maturescente cernua, seminibus nudis utrinque subcompressis. *Lam. ill. t. 838. f. 1.* Floret Junio. *Ann.*

220. *HORDEUM vulgare* (*Xezir*), flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, ordinibus duobus erectioribus. *Lam. ill. t. 49. Black. 423.* Floret Aprili. *Ann.*

221. *HORDEUM murinum* (*Bunexief*), flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris intermediis ciliatis lanceolatis. Floret Majo, ubique vulgare. *Ann.*

222. *HYACINTHUS comosus*, corollis angulato-cylindricis, summis sterilibus longe pedicellatis. *Bauh. hist.* 2. p. 361. Flores fertiles cæruleo-virides, steriles violacei. Aprili. *Peren.*

223. *HYOSCYAMUS albus* (*Mammazeyza*), foliis petiolatis, obtusis sinuatis; floribus sessilibus. *Lam.* 117. f. 2. *Bull. t.* 99. Flores luteo-albi. Martio. *Bien.*

224. *HYOSERIS radiata*, scapis unifloris nudis, foliis glabris lyrato-runcinatis dentatis, lacinia terminali trifida. Floret Aprili. *Per.*

225. *HYPECOUM procumbens* (*Qarn el Mozza*), siliquis arcuatis compressis articulatis. *Lam. t.* 88. *Mill. ic. t.* 150. f. 1. Floret Aprili, inter segetes. *Ann.*

226. *HYPERICUM perforatum* (*Fexfex*), floribus triginis terminalibus paniculatis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis, foliolis calycinis lanceolatis. *Lam. t.* 643. f. 5. *Sabb. hort. 4. t.* 89. *Black. t.* 15. Flores lutei. Junio. *Per.*

227. *HYPERICUM ægyptium*, floribus triginis nectaris petalorum lanceolatis; caulibus suffruticosis, compressis. *Bot. Reg. t.* 196. Floret Februario. *Frut.*

228. *HYPOCHÆERIS radicata*, foliis runcinatis obtusis scabris, caule ramoso nudo lævi, pedunculis squamosis. Hieracium. *Bauh. hist.* 2. p. 238. Flores lutei. Junio. *Per.*

229. *JASMINUM grandiflorum* (*Gesmèn*), foliis oppositis pinnatis, foliolis extimis confluentibus. *Edwards. B. Reg. t.* 91. Flores albi. Junio. *Frut.*

230. *JASMINUM Sambac* (*Gesmèn doblu*), foliis inferioribus cordatis, obtusis, superioribus ovatis, acutis. *Edwards. B. Reg. t.* 1. Mogorium *Lam. ill. t.* 6. f. 1. Flores albi odori. Junio. *Frut.*

231. *ILLECEBRUM Paronychia*, caulibus procumbentibus, foliis lævibus, floribus bracteis nitidis obvallatis. *Clus. hist.* 2. p. 183. Floret Junio in locis sterilibus. *Perennis.*

232. *IMPATIENS Balsamina* (*Ward el hena*), pedunculis unifloris aggregatis, foliis lanceolatis, superioribus alternis, nectariis flore brevioribus. *Sabb. hort.* 7. *t.* 50. *Mill. ic.* 59. Floret Junio. *Ann.*

233. *INDIGOFERA tinctoria* (*Nir*), foliis pinnatis obovatis, racemis brevibus, caule suffruticoso. *Mill. ic.* 34. *Bauh. hist.* 2. *p.* 945. Floret Junio. Colitur in agris. *Per.*

234. *INULA viscosa* Will. (*Tolliera*), foliis sessilibus basi reflexis lanceolatis serratis, caule virgato piloso-viscido, pedunculis axillaribus unifloris foliosis. *Mill. ic.* 103. *Conyza major.* *Clus. hist.* 2. *p.* 20. Flores lutei. Augusto, Septembri. *Per.*

235. *INULA Crithmoides* (*Xerbett*), foliis linearibus carnosis tricuspидatis. *Critmo* 3. *Matt. p.* 520. Flores lutei. Julio. *Per.*

236. *INULA fœtida*, foliis lanceolato-linearibus; integerrimis, corymbis ramosis, radiis florum brevissimis. Flores lutei. Julio. Affinis *Erigeroni fœtido*, habitu *cinerariæ*.

237. *IPOMÆA purpurea* (*Kampanella*), foliis integris, pedunculis multifloris, calyce basi hispido. *Convolvulus major &c.* *Sabb. hort.* 1. *t.* 17. Flores variantes. Julio. *Ann.*

238. *IRIS Pseud-acorus*, imberbis, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. *Bull. t.* 137. *Black. t.* 261. Flores aurei, Aprili, ad fossas. *Per.*

239. *IRIS violacea*, caule multifloro foliis altiore, spathis basi foliaceis, apice margineque scariosis, petalis tribus barbatis emarginatis. *Bull. t.* 141. *Black. t.* 69. Flores rubro-violacei. Martio. *Per.*

240. *JUGLANS regia* (*Geuz*), foliolis ovalibus, glabris, subserratis, subæqualibus. *Lam. ill. t.* 781. *f.* 1. Floret Martio. *Arb.*

241. *JUNCUS conglomeratus* (*Simâr*), culmo nudo stricto, panicula laterali coarctato-capitata, capsulis

brevibus obtusis. *Lam. ill. t. 250. f. 1. Matt. p. 1090.*
Floret Junio. *Per.*

242. JUNIPERUS *phœnicea* (*3arzar*), foliis ternis, oblitteratis, imbricatis. obtusis. *Clus. hist. 1. p. 38.*
Floret Martio. *Arb.*

243. IXIA *Bulbocodium*, foliis filiformibus sulcatis flexuosis, scapo monifloro, spathis tubo corollæ longioribus. *Sabb. hort. 7. t. 4.* Floret Februario. *Per.*

244. LACTUCA *sativa* (*Hass*), foliis rotundatis, caulinis cordatis; caule corymboso. *Black. t. 88.* Floret Februario. *Per.*

245. LACTUCA *virosa*, foliis horizontalibus, dentatis carina aculeatis. *B. hist. p. 1002.* Floret Junio. In aggeribus. *Ann.*

246. LAMIUM *amplexicaule*, foliis radicalibus petiolatis lobatis; superioribus amplexicaulis, rotundis, incis. Flores purpurei. Februario. *Ann.*

247. LAGURUS *ovatus* (*Demb el fenek*); spica ovata villosa. *Lam. t. 41.* Floret Majo, secus vias. *Ann.*

248. LATHYRUS *sylvestris*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, caule alato. *Sabb. hort. 7. t. 20.* Floret Martio. *Ann.*

249. LATHYRUS *Aphaca* (*Porvlina*), pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis; stipulis sagittato-cordatis. *Sabb. hort. 7. t. 22. Mill. ic. 43.* Floret Martio. *Ann.*

250. LATHYRUS *articulatus*, pedunculis subunifloris, cirrhis polyphyllis; foliolis alternis. *Mill. ic. 96.* Floret Majo, inter segetes. *Ann.*

251. LAVATERA *arborea* (*Hobbeyza francisa*), caule crasso altissimo, foliis alternis cordato-subrotundis, septemlobatis pubescentibus, pedunculis aggregatis. Floret Aprili. *Suffrut.*

252. LAVANDULA *Spica* (*Lavanda, Sombor*), foliis sessilibus lineari-lanceolatis integerrimis margine revolutis, spica nuda interrupta. *Lam. ill. t. 504. f. 1. Bull. t. 337.* Floret Junio. *Per.*

253. *LAVANDULA dentata*, foliis sessilibus, linearibus, pectinato-pinnatis, spica coarctata, comosa. *Stæcas crispa* &c. *Clus. hist.* 1. p. 346. Floret Majo. *Frut.*

254. *LAURUS nobilis* (*Rand*), foliis lanceolatis coriaceis subundulatis, umbellis parvis axillaribus, floribus dioicis quatrifidis. *Black. t.* 175. • *Matt. p.* 146. Flores albi, Martio. *Arb.*

255. *LEMNA minor*, foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Black. t.* 380. Floret Junio, in stagnis vulgaris. *Ann.*

256. *LEONTODON Taraxacum*, calyce inferne reflexo, foliis runcinatis, denticulatis, lævibus. *Lam. t.* 653. *Bull. t.* 217. Floret Decembri. *Perenn.*

257. *LEPIDIUM sativum* (*Habberxa*), floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Black. t.* 23. Floret Martio. *Ann.*

258. *LILIUM candidum* (*Gilyu*), foliis lanceolatis sparsis, basi attenuatis; corollis campanulatis intus glabris. *Black. t.* 11. Floret Majo. *Perenn.*

259. *LINUM usitatissimum* (*Kettien*), foliolis calycinis ovatis, acutis, trinerviis; petalis crenatis; foliis lanceolatis alternis; caule subsolitario. *Lam. ill. t.* 219. *Black. t.* 160. Flores cyanei. Majo. *Ann.*

260. *LINUM strictum*, calycibus subulatis; foliis lanceolatis, strictis, mucronatis, margine scabris. Flores lutei. Aprili, Majo. *Ann.*

261. *LITHOSPERMUM officinale*, seminibus levibus; corollis vix calicem superantibus; foliis lanceolatis, lineato-venosis. *Matt. p.* 968. Floret Majo. In aggeribus. *Perenn.*

262. *LOLIUM temulentum* (*Sokrana*), spica aristata, spiculis calyce brevioribus; flosculis ellipticis; culmo superne scabro. *Lam. t.* 48. f. 2. *Bull. t.* 107. Floret Majo. Inter segetes. *Ann.*

263. *LOLIUM perenne*, spica mutica; spiculis calyce longioribus; flosculis lanceolatis. Fl. Aprili, Majo. *Per.*

264. *LONICERA Caprifolium*, floribus ringentibus verticillatis, terminalibus; foliis glabris, summis connato-perfoliatis, inferioribus petiolatis, tantum connatis. *Lam. ill. t. 150. f. 1.* Periclimento *Matt. p. 1025.* Flores extus purpurascens, intus luteo-albi. Aprili. *Frut.*

265. *LOTUS tetragonolobus (Qrempuc)*, leguminibus solitariis, membranaceo-quadrangulis; bracteis ovatis; caulibus procumbentibus, folio intermedio subdentato. *Sabb. hort. 7. t. 33.* Flores rubri. Inter segetes. *Ann.*

266. *LOTUS ornithopodioides*, leguminibus subternatis, arcuatis, compressis; caulibus diffusis. *Bauh. hist. 2. p. 358.* Flores lutei. Martio. *Ann.*

267. *LOTUS corniculatus*, capitulis depressis; caulibus decumbentibus; leguminibus cylindricis, patentibus. Flores lutei, vexillo venis purpurascens notato. Aprili. *Ann.*

268. *LYCIUM europæum (Zawseg)*, spinosum, foliis obliquis, ramis flexuosis, teretibus. *Mich. t. 105. f. 1.* Flores albo-purpurascens. Martio. *Frut.*

269. *LYGEUM Spartum (Halfa)*, *Lam. ill. t. 39.* *Clus. hist. 2. f. 2.* Floret Junio. In regione *Bahrææ.* *Perenn:* Flores omnium graminum maximi.

270. *LYTHRUM hyssopifolium*, foliis alternis, linearilanceolatis, floribus axillaribus solitariis hexandris: *J. Bauh. hist. 3. p. 792.* Flores purpurei exigui. Majo. In inundatis. *Ann.*

271. *MALVA sylvestris (Hobbeyza)*, caule erecto ramoso, foliis alternis, 5-7-lobis obtusis, pedunculis, petiolisque pilosis. *Bull. t. 225. Black. t. 22.* Flores rubro-violacei. Aprili. *Perenn.*

272. *MALVA rotundifolia (Hobbeyza werqha mdawwar)*, caule prostrato, foliis alternis cordato-orbiculatis, obsolete 5-lobis, pedunculis fructigeris declinatis. *Bull. t. 161.* Flores albidi. Aprili. *Ann.*

273. *MARRUBIUM vulgare* (*Marrubia*), foliis ovatis, rugosis, crenatis, dentibus calycinis setaceis, subuncinatis. *Bull. t.* 165. *Black. t.* 479. Flores albi parvi. Majo. *Perenn.*

274. *MARRUBIUM Pseudo-dictamnus*, calycum limbis planis villosis; foliis cordatis, concavis; caule fruticoso. *Sabb. hort. 3. t.* 47. Floret Augusto. *Frut.*

275. *MATRICARIA Chamomilla*, foliis glabris pinnatis; foliolis linearibus integris laciniatisque, radio patente, squamis calycinis dilatatis. *Black. t.* 298. Flores albi, disco luteo. Majo. *Ann.*

276. *MELIA Azederach* (*Lilà*), foliis impari-bipinnatis. *Lam. ill. t.* 352. Floret Majo, ubique comunis. *Arb.* Pulpa fructus venenata est.

277. *MELISSA cretica* (*Qammilta*), incana, foliis subintegerrimis; pedunculis dichotomis axillaribus, in racemos terminales digestis. Calamintha folio, & flore parvo incana. *J. Bauh. hist. 3. p.* 230. Floret per totam æstatem. *Perenn.*

278. *MELISSA officinalis*, verticillis dimidiatis, corollæ galea emarginata, lobo medio labii integro obtuso, foliis ovatis acutis crenatis, pilosis. *Black. t.* 27. *Sabb. hort. 3. t.* 61. Flores albi. Majo. *Perenn.*

279. *MENTHA Pulegium* (*Pleyyu*), floribus verticillatis, foliis ovatis, caule prostrato, pedicellis calycibusque undique tomentosus, dentibus ciliatis. *Lam. ill. t.* 503. *f.* 2. *Black. t.* 302. Floret Junio. *Perenn.*

280. *MERCURIALIS annua* (*Burikba*), caule brachiato, foliis glabris, floribus racemosis, radice fibrosa. *Bull. t.* 159. *Black. t.* 162. Floret Februario. *Ann.*

281. *MUSA sapientum* (*Banana*), floribus hermaphroditis ut plurimum pentandris, rarissime hexandris, in verticillos dimidiatos, supra spadicem nutantem dispositis, primis persistentibus, ultimis deciduis. *Nob.* Floret Junio. *Perenn.* Hospitatur in hortis sub dio.

INDEX GENERUM PLANTARUM

juxta sexuale LINNÆI systema dispositus.

CLASSIS I. MONANDRIA

Ordo *Monogynia*

Canna

CLASSIS II. DIANDRIA

Ordo *Monogynia*

Jasminum

Ordo *Digynia*

Anthoxanthum

Bromus 78.

CLASSIS III. TRIANDRIA

Ordo *Monogynia*

Crocus

Iris

Gladiolus

Ixia

Cyperus

Lygeum

Juncus 241.Ordo *Digynia*

Alopecurus

Lagurus

Briza

Festuca

Bromus

Avena

Arundo

Hordeum

Lolium

Cynosurus

CLASSIS IV. TETRANDRIA

Ordo *Monogynia*

Galium

Cardamine 92.Ordo *Digynia*

Hypecoum

CLASSIS V. PENTANDRIA

Ordo *Monogynia*

Cerinthe

Echium

Heliotropium

Lithospermum

Borago

Cynoglossum

Anchusa

Anagallis

Convolvulus

Hyosciamus

Chironia

Ipomæa

Capsicum

Lycium

Campanula

Lonicera

Impatiens

Hedera

Celosia

Illecebrum

Musa

Ordo *Digynia*

Cuscuta
Asclepias
Cressa
Chenopodium
Beta
Herniaria
Gomphrena
Eryngium
Caucalis
Daucus
Ammi
Bupleurum
Cuminum
Ferula
Crithmum
Coriandrum
Chærophyllyum
Anethum
Apium

Ordo *Trigynia*

Alsine
Arenaria

Ordo *Pentagynia*

Linum

CLASSIS VI. HEXANDRIA

Frankenia
Allium
Aloë
Hyacinthus
Asphodelus
Asparagus
Lilium
Juncus

Ordo *Trigynia*

Colchicum

CLASSIS VIII. OCTANDRIA

Ordo *Monogynia*

Epilobium
Chlora
Erica

CLASSIS IX. ENNEANDRIA

Ordo *Monogynia*

Laurus

CLASSIS X. DECANDRIA

Ordo *Monogynia*

Melia
Fagonia
Arbutus

Ordo *Digynia*

Dianthus

Ordo *Trigynia*

Arenaria
Cucubalus

Ordo *Pentagynia*

Cotyledon
Cerastium

CLASSIS XI. DODECANDRIA

Ordo *Monogynia*

Lythrum

Ordo *Trigynia*

Euphorbia

CLASSIS XII. ICOSANDRIA

Ordo *Monogynia*

Cactus
Amygdalus

Ordo *Polyginia*

Fragaria

CLASSIS XIII. POLYANDRIA

Ordo *Monogynia*

Chelidonium
Capparis

Ordo *Trigynia*

Delphinium

Ordo *Polyginia*

Clematis

Anemone

Adonis

CLASSIS XIV. DIDYNAMIA

Ordo *Gymnospermia*

Glecoma

Lavandula

Mentha

Ajuga

Lamium

Ballota

Marrubium

Melissa

Ordo *Angiospermia*

Aloysia

Acanthus

Euphrasia

Celsia

Antirrhinum

CLAS. XV. TETRADYNAMIA

Ordo *Siliculosæ*

Alyssum

Lepidium

Biscutella

Ordo *Siliquosæ*

Erysimum

Cheiranthus

Brassica

Cardamine

CL. XVI. MONADELPHIA

Ordo *Pentandria*

Frodium

Ordo *Decandria*

Geranium

Ordo *Polyandria*

Malva

Lavatera

Althæa

Gossypium

CLAS. XVII. DIADELPHIA

Ordo *Hexandria*

Fumaria

Ordo *Decandria*

Anthyllis

Ervum

Astragalus

Hedisarum

Hypocrepis

Lathyrus

Coronilla

Indigofera

Cicer

Lotus

C. XVIII. POLYADELPHIA

Ordo *Icosandria*

Citrus

Ordo *Polyandria*

Hypericum

CLASSIS XIX. SYNGENESIA

Ordo *Æqualis**(Flosculi omnes hermaphroditi)*

Geropogon

Cichorium

Hypochæris

Leontodon

Lactuca

Hyoseris

Helminthia

Carthamus

Cynara

Carduus

Ordo *Superflua**(Flos. disci hermaphr. radii fœm.)*

Artemisia

Gnaphalium

Bellis

Chrysanthemum

Matricaria

Inula

Erigeron

Cineraria

Anthemis

Buphtalmum

Ordo *Frustranea**(Flos. disci fertiles, radii steriles)*

Centaurea

Helianthus

Ordo *Necessaria**(Flos. fœm. sive radii soli fertiles)*

Calendula

CLASSIS XX. GYNANDRIA

Ordo *Polyandria*

Arum

CLASSIS XXI. MONOECIA

Ordo *Monandria*

Cynomorium

Ordo *Diandria*

Lemna

Ordo *Triandria*

Coix

Ordo *Tetrandria*

Buxus

Ordo *Pentandria*

Ambrosia

Amaranthus

Ordo *Polyandria*

(5)

Juglans

Corylus

Ordo *Monadelphica*

Cupressus

Croton

Cucumis

Cucurbita

Ordo *Gynandria*

Andrachne

CLASSIS XXII. DIOECIA

Ordo *Pentandria*

Cannabis

Ordo *Octandria**Laurus 254.*Ordo *Enneandria*

Mercurialis

Ordo *Monadelphica*

Juniperus

CLAS. XXIII. POLYGAMIA

Ordo *Monoecia*

Holcus

Ægilops

Andropogon

Atriplex

Ordo *Dioecia*

Fraxinus

Ordo *Trioecia*

Ceratonia

Ficus

CL. XXIV. CRYPTOGAMIA

Ordo *Equisetaceae*

Equisetum

Ordo *Filices*

Adiantum

Ordo *Fungi*

Agaricus

INDEX

NOMINUM MELITENSIVM TRIVIALIVMQUE.

A		D [dalet]	
<i>Altèa</i>	No. 21	<i>Dakra</i>	No. 26
<i>Alwìza</i>	„ 18	<i>Demb el fenek</i>	„ 247
B		<i>Demb el Ziemel</i>	„ 173
<i>Banana</i>	„ 281	<i>Dixiplina</i>	„ 24
<i>Basal</i>	„ 9	<i>Dohhanet l' Ard.</i>	„ 198
<i>Baytar ta l' Indya</i>	„ 83	<i>Dokkàr</i>	„ 194
<i>Bebùna</i>	„ 38	<i>Dolliez</i>	„ 153
<i>Bellùs</i>	„ 98	E	
<i>Bergamott</i>	„ 128	<i>Edera terrestri</i>	„ 204
<i>Berquq</i>	„ 53	<i>Endivya</i>	„ 124
<i>Besbies</i>	„ 36	<i>Erbabyanka</i>	„ 55
<i>Berwieq</i>	„ 63	<i>Eruka</i>	„ 76
<i>Betravi</i>	„ 70	F	
<i>Bettih</i>	„ 151	<i>Fatata</i>	„ 37
<i>Brankorsina</i>	„ 1	<i>Fedloqqom</i>	„ 73
<i>Bsima</i>	„ 182	<i>Ferla</i>	„ 192
<i>Bumneyher</i>	„ 138	<i>Fexfiex</i>	„ 226
<i>Bunexxief</i>	„ 221	<i>Foqqiez</i>	„ 6
<i>Burikba</i>	„ 280	<i>Frawli</i>	„ 195
<i>Busieq</i>	„ 133	<i>Fraxnu</i>	„ 197
<i>Bùx</i>	„ 82	G [gim]	
<i>Bzàr</i>	„ 90	<i>Gellewz.</i>	„ 142
C [cim]		<i>Gemmùza.</i>	„ 184
<i>Centawrya</i>	„ 118	<i>Gesmàn.</i>	„ 229
<i>Cetràt</i>	„ 128	<i>Gewz</i>	„ 240
<i>Cicri</i>	„ 122	<i>Gilyu.</i>	„ 258
<i>Cikuta</i>	„ 134	<i>Gizi</i>	„ 109
<i>Cikweyra</i>	„ 123	<i>Gummàr</i>	„ 108
<i>Cipress</i>	„ 156	<i>Gyacint.</i>	„ 222
<i>Coplays</i>	„ 15		

H [het]		L	
<i>Habbirwa</i>	No. 257	<i>Lilà</i>	No. 276
<i>Habb el gamh.</i>	" 203	<i>Liedna</i>	" 209
<i>Habb zaziz</i>	" 163	<i>Lsien el fart</i>	" 31
<i>Hafur</i>	" 65	<i>Lsien el kelb</i>	" 159
<i>Halfa</i>	" 269	<i>Lumi</i>	" 128
<i>Hannewia</i>	" 1	M	
<i>Harira</i>	" 29	<i>Mammazeyza</i>	" 223
<i>Harxaya</i>	" 200	<i>Melissa</i>	" 278
<i>Harrub</i>	" 105	<i>Marrerita</i>	" 67
<i>Hass</i>	" 244	<i>Marrubia</i>	" 273
<i>Hatar ta S. Gus.</i>	" 20	<i>Mentna</i>	" 25
<i>Hawh</i>	" 28	N	
<i>Hobbeyza</i>	251. 271	<i>Nezew.</i>	" 75
<i>Horfox</i>	" 94	<i>Nettiena.</i>	" 116
<i>Hyar</i>	" 150	<i>Nir</i>	" 233
K [kef]		P	
<i>Kamomilla</i>	" 275	<i>Pleyyu</i>	" 279
<i>Kampanella</i>	" 237	<i>Porvlina</i>	" 249
<i>Kappàr</i>	" 89	<i>Piedalwett</i>	" 165
<i>Karfùs</i>	" 48	Q [qof]	
<i>Kemmàn</i>	" 155	<i>Qammilta</i>	" 277
<i>Kettien</i>	" 259	<i>Qanfuda</i>	" 125
<i>Kokku.</i>	" 87	<i>Qanneb</i>	" 88
<i>Korràt</i>	" 12	<i>Qaqocc</i>	" 158
<i>Kosbor</i>	" 137	<i>Qarabocc</i>	" 219
<i>Kromb.</i>	" 74	<i>Qaraz</i>	152. 154
<i>Kromb el bahar.</i>	" 126	<i>Qarn el mozza</i>	" 225
<i>Kusksua.</i>	" 216	<i>Qasab</i>	" 60
L		<i>Qasgayza</i>	" 149
<i>Laring</i>	" 129	<i>Qoton</i>	" 207
<i>Lavanda</i>	" 252	<i>Qrempuc</i>	" 265
<i>Leblieb</i>	" 135	<i>Qronfol</i>	" 168
<i>Lellux.</i>	" 120	R	
<i>Lewz</i>	" 27	<i>Rand</i>	" 254

S		V	
<i>Sabbara</i>	No. 16	<i>Vaynilya</i>	No. 214
<i>Selq</i>	" 69	W [waw]	
<i>Sfonnària</i>	" 164	<i>Ward el hena</i>	" 232
<i>Sieq el hamiema</i>	" 166	<i>Ward el xemx</i>	" 212
<i>Sigret el harin</i>	" 61	X [xin]	
<i>Sigret el kalli</i>	" 144	<i>Xantkura</i>	" 7
<i>Silla</i>	" 211	<i>Xerbett</i>	" 235
<i>Simàr</i>	" 241	<i>Xewwekìa</i>	" 2
<i>Soffeyra</i>	" 85	<i>Xibt</i>	" 35
<i>Sokrana</i>	" 262	<i>Xkomp</i>	" 128
<i>Sombor</i>	" 252	<i>X3ir</i>	" 220
<i>Sorfolya</i>	" 107	Z [zayn]	
<i>Sozda</i>	" 162	<i>Za3fràn</i>	" 147
<i>Spika</i>	" 252	<i>Zazzieza</i>	" 175
<i>Spràg</i>	" 62	<i>Zerrizet el qamel</i>	" 167
T		<i>Zofsfa</i>	" 180
<i>Tè falts</i>	" 115	<i>Zokret l'azguza</i>	" 143
<i>Tenzùd</i>	" 187	<i>Zwien</i>	" 193
<i>Tewm</i>	8. 10	7 [7imel]	
<i>Tin</i>	" 194	<i>7arni</i>	" 56
<i>Tolliera</i>	" 234	3 [3ayn]	
<i>Torsin</i>	" 49	<i>3ads</i>	" 179
<i>Torsin el bir</i>	" 3	<i>3allet el serdùk</i>	" 4
<i>Trong</i>	" 127	<i>3ar3àr</i>	" 242
<i>Tsannur</i>	" 158	<i>3awseg</i>	" 268
<i>Tornesòl</i>	" 148	<i>3erq el generàl</i>	" 160
U		<i>3obbeyra</i>	" 114
<i>Ubriatola</i>	" 50	<i>3orzàs</i>	" 57
		<i>3osfor</i>	" 95

FINIS FASCICULI PRIMI.

Pag.	No.	Errata	Corrige
6.	50.	Ubriagola	Ubriatola
23.	215.	HELMINTIA	HELMINTHIA
24.	227.	Ægyptium ^d	Ægyptium

Cætera benevolus Lector emendet.